

धानको पहेलो गवारो कीरा (Yellow stem Borer) नियन्त्रणको लागि मोहिनी पासो (YSB Lure) र
Funnel trap (फनेल ट्राप) वितरण

- प्रति कठ्ठा १ थान मोहिनी पासो राख्नु पर्दछ ।
- एकपटक राखेपछी ४५ दिनसम्म काम गर्दछ । पुनः पासो राख्न सकिने ।
- राख्न लाई सजिलो
- भाले माउ पुतली मोहिनी पासोमा पर्ने हुदा विषादीको प्रयोग गर्न नपर्ने ।
- नगरपालिकाबाट प्रति सेट रु १०० मा उपलब्ध गराएको



Life cycle : *Scirpophaga incertulas* take 30-45 days from egg to adult, and per year 5-6 generations.





गवारी कीराको लागि प्रयोग गरिएको मोहिनी पासो



Species

Pheromone lure are species specific



Pure

Pheromone used 99.9% pure



Life

It is work 24 hours non-stop
* lets up to 45 days



Handling

Use hand-gloves or clean hands



Durable

Lure can stay for one year without removing from packing



Weather

Pheromone lure works on weather condition



यस ब्रोसरमा राखिएका फोटोहरु नमूना मात्र हुन् ।

थप जानकारीको लागि कृषि शाखा रत्ननगर नगरपालिका चितवन

प्रविन लामा कृषि अधिकृत

९८४५८१७०१३

बासुदेव खनाल, सहायक चौथौ

९८४८०८४८२६